

Acyklowir

Lek przeciwwirusowy (stosowany do oka)



- W. podczas leczenia nie należy używać soczewek kontaktowych
- D. 5 × dz. nanosić grudkę maści o długości 1 cm na dolną część worka spojówkowego – po ustąpieniu objawów terapię kontynuować jeszcze przez 3 dni
- DN. podrażnienie i pieczenie spojówek, zab. widzenia związane z załamaniem światła przez tłustą maść
- P/w. brak wystarczających danych dotyczących stosowania w okresie ciąży

Akamprozat

Lek stosowany w leczeniu uzależnienia od alkoholu



- Z. bezpośrednio po detoksykacji
stosować regularnie, również w przypadku nawrotów
- D. **pacj. < 60 kg m.c.:** 1332 mg/d (rano 666 mg, w południe 333 mg i wieczorem 333 mg)
pacj. > 60 kg m.c.: 1998 mg/d, podzielone na 3 dawk. jedn.;
obliczone jako sól wapniowa akamprozatu
zalecany okres leczenia wynosi 1 rok
- W. **unikać alkoholu w każdej postaci! skrócenie trwania leczenia i/lub zmniejszenie dawk. dzien. tylko po konsultacji lekarskiej**
akamprozat nie nadaje się do leczenia objawów odstawienia alkoholu;
zachować ostrożność przy kamicy nerkowej
- P/w. ciężkie zab. czynności wątroby, zab. czynności nerek; brak danych dotyczących stosowania u małych dzieci i pacj. > 65 r.ż.
- DN. **dolegl. żołądk./jelit. (od czasu do czasu), świąd (od czasu do czasu) zab. pobudliwości seksualnej (od czasu do czasu)**
[Doniesienia te nie są kompletne – proszę wziąć pod uwagę objaśnienia i wskazania w rozdz. 2 – *przyp. tłum.*]

Akarboza

Doustny lek hipoglikemizujący, inhibitor α -glukozydazy



- Z.** stosować regularnie, z pierwszym kąsem posiłku
- D.** początkowo, np. 1–2 × dz. 50 mg, potem zwiększać dawki do 3 × dz. 100 mg, maks. 3 × dz. 200 mg
- W.** przestrzegać zalecanej diety; unikać potraw działających wzdymająco (DN. ↑); w przypadku hiperglikemii koniecznie spożywać cukier gronowy (glukozę) – nie cukier „domowy” zawierający sacharozę
- P/w.** małe dzieci i młodzież; ciężkie zab. czynności nerek; przewl. ch. jelit z wyraźnymi zab. trawienia i wchłan.; nasilenie wytwarzania gazów w jelitach (np. powiększenie przepukliny lub niedrożność jelit)
- DN.** wzdęcia (często), biegunki i bóle brzucha (od czasu do czasu)
- WI.** „domowy” cukier (sacharozą) nasila dolegl. jelit. (biegunki); leki hamujące wydzielanie soku żołądkowego i enzymy trawienne (kw. ↓); nie jest polecane połąc. z orlistatem, brak danych