

12 Do hiperproteinemii prowadzi:

- 1) marskość wątroby
- 2) wirusowe zapalenie wątroby
- 3) sarkoidoza
- 4) makroglobulinemia Waldenströma

Poprawna odpowiedź to:

- A. 1, 2 i 3
- B. 1 i 3
- C. 2 i 4
- D. Tylko 4
- E. Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne

13 Dysproteinemia nie towarzyszy:

- A. Ostрым stanom zapalnym
- B. Odwodnieniom hipertonicznym
- C. Marskości wątroby
- D. Nowotworom
- E. Żadna z podanych odpowiedzi nie jest poprawna

14 Najpopularniejszym nośnikiem stosowanym w elektroforezie białek surowicy krwi w medycznych laboratoriach diagnostycznych jest obecnie:

- A. Agaroza
- B. Agar
- C. Octan celulozy
- D. Poliakrylamid
- E. Skrobia

15 Podczas elektroforezy w środowisku o pH:

- A. Niższym od pI białko ma ładunek dodatni i migruje do anody
- B. Niższym od pI białko ma ładunek dodatni i migruje do katody
- C. Wyższym od pI białko ma ładunek dodatni i migruje do anody
- D. Wyższym od pI białko ma ładunek dodatni i migruje do katody
- E. Odpowiedzi A i D są poprawne